

Agri Topic
あぐりとぴっく

秋どれ

上手な野菜の育て方 スイートコーン

今からでも間に合います!

栽培方法	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	品種
露地栽培				○	○			■	■■■■■				あまいコーン あまいパンタム

① 栽培時期と品種

○ 種まき ■ 収穫

② 栽培上の注意点

- ①強い日照を好む作物で、耕土が深く水はけの良い保水力のある肥沃地がよい。
- ②ある程度の面積を作らないと交配がうまくいかず歯抜けになりやすい。

③ 敖づくり

強い日照を好むので南北に敖を作り、排水をよくする。敖幅は90cm高さ10cmくらいにし深く耕す。
※マルチを使用する場合は敖立後一雨当ててから土壤に密着するよう覆う。

④ 本田肥料

種まき2週間前に1坪(3.3m²)に牛糞堆肥7kg苦土セルカ400gを施し耕しておく。その後植え付け前に野菜化成500gを施す。
※マルチ栽培は、野菜化成を2割程度少なくする。

追肥

1回目…本葉が6~7枚出たら追肥を行う。野菜化成1kgを施す(1坪)。
2回目…頭の穂が出たら、野菜化成1kgを施す(1坪)。

⑤ 種まき

株間30cm条間70cmの2条で1ヶ所3粒蒔き、深さ3cm前後に播種する。
種まき後十分灌水を行う。
※マルチ栽培は、マルチ穴あけ器等で穴をあけたところに3粒蒔くとよい。

Point

- 肥料を吸う力が強いので、完熟堆肥をすき込み土壤の地力を高めておく事が重要。
- 朝に収穫すると食味が良い。すぐに食味しない時は呼吸による消耗を防ぐため、皮をつけて冷蔵庫の野菜室に保存し、1~2日以内の食味がおすすめ。
- 風が吹いてトウモロコシが倒れても、触らずそのままにしておくと立ってくる。無理に起こすと根を痛めるので触らない。

⑥ 間引き

本葉3枚の時に生育が良く高さが揃っているものを1本残し、2本は根を傷付けないようハサミで切り取る。
※マルチ栽培では草丈30cm頃マルチを取り除く。

⑦ 土寄せ・分けつ芽の除去

本葉5枚時、マルチ栽培はマルチを除去した後、軽く中耕して土寄せをし倒伏を防ぐ。
根元から出る分けつ芽は養分を奪うので早めに取除く。

⑧ 収穫

収穫は絹糸が抽出して20日程度で果粒が太り雌穂が横に傾き絹糸が褐色になってからが良い。

⑨ 病害虫

病気はほとんど問題ない。
害虫は主にアワノメイガで、防除しないと軸が折れてしまう。

トレボン乳剤 1000倍溶液
収穫7日前まで 総使用回数は4回まで
(参考)散布時期は雄穂が出た時に1回目、雄穂が出た時に2回目を散布。